

Cazuri de infectie cu virus Chikungunya, departamentul Var, Franta

Doua cazuri autohtone de chikungunya au fost diagnosticate in departamentul Var din provincia Provance, regiunea Coasta de Azur Alpi, din sud-estul Frantei.

Data debutului simptomelor la primul caz este 2 august 2017. Cazul a fost confirmat cu laboratorul prin PCR in 9 august. Probele de la primul caz au fost retestate in data de 11 august in Laboratorul National de Referinta, cu acelasi rezultat pozitiv.

In data de 14 august a fost confirmat cel de-al doilea caz. Un al treilea caz suspect a avut rezultate PCR negative, in data de 16 august.

Autoritatatile nationale franceze au luat urmatoarele masuri:

- Masuri de control a vectorilor in jurul locuintei si a locului de munca a cazurilor
- Cautare activa a cazurilor: orice caz suspect detectat este investigat cu laboratorul prin recoltarea de probe de sange pentru confirmarea diagnosticului
- Comunicare catre populatia locala privind aplicarea masurilor de protectie importiva intepaturilor de tantari, coordonata de catre Agentia Regionala de Sanatate

Evaluarea de risc a OMS

Transmisia a fost raportata pentru prima data in Europa in anul 2007, intr-un focar epidemic din nord-estul Italiei. In acest focar epidemic au fost inregistrate 197 de cazuri si el a fost confirmat ca focar epidemic in Europa determinat de Aedes Albopictus. In septembrie 2010 au fost confirmate 2 cazuri indigene in departamentul Var din sud-estul Frantei. In plus, in Octombrie 2014 au fost confirmate 11 cazuri indigene in Montpellier, Franta. Avand in vedere ca: Aedes Albopictus este stabilit in tot bazinul mediteranean si ca acest vector a demonstrat in trecut capacitatea de a sustine un focar epidemic, faptul ca aria respectiva este o importanta zona turistica in special in perioada de vara si ca zona unde au fost confirmate acum cazurile este in apropiere de granita cu Italia (cu populatii stabilite de Aedes Albopictus) exista un risc potential de raspandire internationala. Excesul de precipitatii in ariile afectate in urmatoarele luni ar putea declansa o crestere a transmisiei, asa cum s-a intamplat in 2014.

Recomandari OMS:

Populatia care calatoreste in aceasta zona din Franta trebuie sa-si ia precautiile de baza, care includ:

- purtarea de imbracaminte care minimizeaza expunerea pielii la intepaturi de tantari, in timpul zilei (camasi cu maneci lungi si pantaloni lungi)
- utilizarea de repelente
 - o Repelentele pot fi aplicate pe pielea expusa sau pe imbracaminte in stricta concordanță cu instructiunile produsului. Repelentele trebuie să conțină DEET (N, N-dietil-3 metilbenzamida), IR 3535 (ester etilic al acidului 3-[N-butil-N-acetil], aminopropionic) sau Icaridin (acid 1-piperidin carboxilic, 2-(2-hidroxi etil)-1-metil propil ester).
- asigurarea ca in camera au plase la ferestre pentru a impiedica intrarea tantarilor.

- In timpul repausului/somnului, sa utilizeze plase impotriva tantarilor in jurul paturilor, mai ales in timpul zilei cand tantarii Aedes sunt cei mai activi.
- Sa inchida usile si ferestrele, sa utilizeze in incaperi bariere fizice (ecrane, plase) la usi, ferestre, imbibate in substante insecticide, sa utilizeze aerul conditionat si vaporizatoare cu insecticide.

Specia de tantari Aedes Albopictus se dezvolta intr-o gama larga de containere umplute cu apa, inclusiv scorburile de copaci si adancituri in stanga, in plus, in recipiente artificiale cum ar fi anvelope uzate, farfuriiile ghivecelor de flori, butoaielor si cisterne cu apa, bazine de capturare a apei.

Controlul vectorilor se bazeaza pe reducerea acestor habitate naturale si artificiale care sustin reproducerea tantarilor. Aceasta necesita mobilizarea populatiei din comunitatile afectate, intarirea supravegherii entomologice pentru a evalua impactul masurilor de control aplicate si implementarea unor masuri aditionale de control, daca situatia o impune.

In timpul focarelor epidemice pulverizarea in spatiul interior a insecticidelor determina distrugerea tantarilor maturi cat si a larvelor imature.

Surse:

· Institute de Veille Sanitaire

<http://www.invs.sante.fr>

· World Health Organization Regional Office for Europe

http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/246164/Fact-sheet-Chikungunya-Eng.pdf?ua=1

· World Health Organization

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en/>